

BINTURONG

Arctitis binturong

Classe : MAMMIFERES

Ordre : CARNIVORES

Famille : VIVERRIDES



REPARTITION GEOGRAPHIQUE :

Le binturong est un mammifère qui vit dans les forêts primaires et secondaires d'Asie du Sud-Est.

Il peut être observé au Bangladesh, au Bhoutan, au Cambodge, en Chine, en Inde, au Vietnam, au Laos, en Thaïlande, en Indonésie (sur l'île de Java, Kalimantan, Bornéo et Sumatra), en Malaisie (sur l'île de Sarawak, Sabah (Bornéo) et la péninsule Malaisienne), au Myanmar, au Népal et aux Philippines (uniquement sur l'île de Palawan).

Bien que plusieurs études génétiques aient été menées sur l'espèce, le nombre de sous-espèces reste indéterminé et fait l'objet de débats dans la communauté scientifique.

HABITAT :

Dans les grandes forêts d'Asie du Sud-Est peu dégradées par l'homme.

IDENTIFICATION :

La couleur de son poil varie du gris foncé au gris clair et peut être teintée de brun. Ses oreilles sont rondes, bordées de blanc et se finissent en houppette de poils comme le lynx. Ses yeux sont de couleur marron chocolat. Il a des griffes aiguisées qui lui permettent de grimper dans les arbres et de se déplacer avec aisance sur les branches. Pour garder son équilibre, il peut aussi s'aider de sa queue, qui est préhensile et qui lui permet aussi de s'accrocher aux branches et saisir certaines choses.

Un binturong adulte mesure entre 60 et 90 cm auxquels s'ajoute une queue pouvant atteindre 90 cm. Son poids peut varier de 9 à 24 kg. Les binturongs vivant sur les îles sont plus petits que ceux du continent.

NOURRITURE :

Les binturongs consomment principalement des fruits et jouent ainsi un rôle décisif dans la dissémination et la germination des graines. Occasionnellement, ils peuvent également se nourrir de petites proies (lézards, rongeurs, petits oiseaux, ...), d'insectes ou d'œufs.

MOEURS :

Les binturongs sont arboricoles, nocturnes et plutôt solitaires. Leur comportement a été peu étudié dans le milieu naturel, si bien qu'on sait encore très peu de choses sur son utilisation du territoire et les interactions sociales entre individus.

Il a la particularité de sentir le pop-corn. Cela est dû à un composé contenu dans son urine qui lui permettrait de communiquer avec les autres individus de son espèce en donnant des informations tel que son sexe et son statut reproducteur.

REPRODUCTION :

Le binturong peut se reproduire tout au long de l'année. Après une gestation de 3 mois, la femelle donne naissance à une portée de 1 à 3 petits binturongs. Ils naissent aveugles, comme des chatons. En captivité, ils sont allaités par leur mère pendant plus de 3 mois. Au bout de 25 jours après la naissance, leurs dents commencent à pousser et à partir de leur 45ème jour, ils peuvent manger de la nourriture solide (fruit, viande...).

SITUATION ACTUELLE :

Le binturong a été très peu étudié par les scientifiques, et aujourd'hui aucun comptage de population n'a encore été effectué. Malgré cela, en raison des menaces qui pèsent sur lui, le binturong est considéré comme « Vulnérable » par l'IUCN. Localement, il peut être considéré comme d'avantage menacé, comme aux Philippines, où il est considéré comme « En Danger » par les autorités locales.

Les principales menaces auxquelles les binturongs ont à faire face sont :

1 – la destruction et le morcellement de leur habitat

2 – le commerce illégal pour en faire des animaux de compagnie, pour les intégrer aux fermes qui produisent du café de civette ou pour la médecine traditionnelle chinoise et vietnamienne.

La principale cause de la disparition du binturong demeure la déforestation qui s'est intensifiée du fait de la plantation de palmiers à huile, d'hévéas et de tecks.

Le binturong est également touché par le braconnage, aussi bien pour sa viande, sa compagnie ou plus rarement pour sa fourrure qui peut être utilisée comme élément de décoration. Il est considéré au Laos comme un met particulièrement goûteux et est réputé assez facile à attraper, ce qui en fait une espèce particulièrement sensible à la pression de chasse.

De plus, à l'instar des autres civettes, les glandes péri-anales sont utilisées dans la médecine traditionnelle vietnamienne pour provoquer des avortements et traiter les maladies mentales.

A ces premières menaces s'ajoute une nouvelle tendance, celle des fermes de civettes utilisées afin de produire du café. En effet, les cerises du caféier sont données à manger aux civettes car ces dernières digèrent la pulpe mais pas le grain qui est récupéré dans leurs excréments afin d'être torréfié et vendu sous la dénomination « Kopi Luwak ». Il s'agit aujourd'hui du café le plus cher au monde. Les conditions de captivité sont inadaptées à ces civettes, ce qui génère un fort taux de mortalité. On estime à quelques milliers de civettes prélevées dans leur milieu naturel chaque année pour alimenter les fermes à café, ce qui constitue une menace grandissante pour le binturong.

Agathe.Debruille/Françoise LENOIR/ novembre 2021

MING-MING

Femelle binturong



Mig-Ming est d'âge inconnu

Elle a été confisquée à Palawan par des officiers du gouvernement philippin puis confiée au Palawan Wildlife Rescue and Conservation Center (PWRCC), l'unique centre de soins à la faune sauvage de Palawan.

Trop habituée à l'Homme, elle ne peut pas être relâchée dans la nature car elle risquerait de se mettre en danger en approchant trop près des zones habitées.

Ming-ming se porte bien mais vit aujourd'hui dans un enclos délabré et peu adapté à son mode de vie arboricole.

Depuis 2019, l'association ABConservation œuvre en partenariat avec le PWRCC pour offrir de meilleures conditions de vie à ses pensionnaires à travers la rénovation des enclos vétustes du centre, la mise en place d'enrichissements et aussi en travaillant sur un protocole de relâcher progressif pour réhabituer les animaux détenus par le PWRCC à la vie sauvage et envisager ainsi leur relâché dans des zones protégées.

SECAS- MNHN – 57, rue Cuvier-CP31 – 75005 Paris – 01 40 79 56 52

E-mail : secas@secas.org - site <http://secas.org>

Ouverture : tous les jours de 11 heures à ½ heure avant la fermeture de la Ménagerie